

LES EXAMENS DU DÉBUT DE GROSSESSE

2^e mois

Les examens	Pourquoi ?
La détermination du groupe sanguin et du rhésus si besoin (prises de sang – 2 déterminations sont nécessaires)	Une carte de groupe est indispensable pour le jour de l'accouchement. Si vous êtes de rhésus négatif, un suivi particulier est nécessaire, notamment en cas de saignement ou de choc sur le ventre.
Un frottis (si le dernier a plus de 3 ans)	Dépister des lésions précancéreuses du col utérin. En cas de lésions, un traitement peut être nécessaire en cours de grossesse ou le plus souvent après l'accouchement (laser, conisation).
La sérologie de la rubéole (prise de sang)	Si vous n'êtes pas immunisée, un contrôle sera proposé à 4 mois pour s'assurer que vous ne l'avez pas attrapée durant la période à risque pour votre bébé. Une vaccination vous sera proposée après l'accouchement.
La sérologie de la toxoplasmose (prise de sang)	Si vous n'êtes pas immunisée, vous devrez respecter quelques mesures hygiéno-diététiques et pratiquer une sérologie chaque mois.
La sérologie de la syphilis (prise de sang)	En cas de syphilis, un traitement sera institué.
La recherche d'agglutinines irrégulières ou RAI (prise de sang)	Décélérer dans votre sang la présence d'anticorps dirigés contre d'autres groupes sanguins. Certains impliquent des précautions particulières pendant la grossesse et l'accouchement.
La sérologie du VIH (prise de sang)	Dépister une infection VIH qui implique un traitement et un suivi particuliers en cours de grossesse et des précautions à l'accouchement.
Une glycémie à jeun (prise de sang)	Décélérer un diabète méconnu si vous présentez des facteurs de risque (antécédents familiaux de diabète, surpoids, âge > 35 ans).
La sérologie de l'hépatite B et de l'hépatite C (prise de sang)	En cas d'hépatite B ou C active, un traitement pourra vous être recommandé. Pour l'hépatite B, une vaccination sera proposée pour votre bébé à sa naissance.

IL ÉTAIT 9 MOIS

© Éditions Albin Michel, 2019